

# 杭州市临安区林业有害生物

## 病虫害情报

临安区植物检疫站  
电话：0571-89540922

2023 年第 7 期  
2023 年 8 月 14 日

### 及时开展山核桃食叶害虫防治

目前，我区山核桃部分产区食叶害虫危害进入高发期，据 8 月 6-12 日调查显示：岛石镇银坑、茶亭、呼日等村受害面积较大，以胡桃豹夜蛾、眼斑钩蛾、绿腿腹露蝗为主，危害面积达 1.5 万亩以上，马头岭等局部区域株危害率达 100%，叶片被害率达 80.2%，每张叶片取食面积超过 2/3，属重度危害。仁里、新桥等地以木撩尺蠖危害为主，危害程度较轻。

胡桃豹夜蛾、眼斑钩蛾，一年发生四代；木撩尺蠖，一年发生两代，均以幼虫暴食山核桃叶片为害，低龄幼虫取食叶片呈缺刻状，3 龄幼虫食叶量剧增，暴食全叶仅留叶柄和叶脉；绿腿腹露蝗可吃光全部叶片，严重影响山核桃产量和次年生产。

#### 防治意见

做好虫情调查，抓紧时间开展防治，同时结合山核桃生长发育营养需求，补充氮磷钾等元素，促进果实发育，提高果实产量和品质。

#### 防治方法

1、诱虫灯诱杀成虫。在林间安装诱虫灯诱杀，一盏诱虫灯可控

45-50 亩山核桃林。

2、药剂防治。选用 30%氯虫.苯甲酰胺水分散粒剂 5000 倍液或 5%氯氟噻虫嗪微囊悬浮剂 1000 倍或 5%高氯甲维盐微乳剂 1000 倍液喷雾防治。叶面肥可选择 7-12-40 高钾水溶肥 800 倍液。

---

测报：张晟璐

签发：仇智灵